Observation

Sur l'étranglement d'une portion de l'intestin ileon, dans l'intérieur du bas-ventre.

Quoique la Chirurgie ait découvert, dans l'intérieur du bas-ventre, divers étranglemens d'intestins, je ne crois pas qu'elle ait beaucoup d'exemples semblables à celui qui fait le sujet de cette observation.

Le 10 du mois de Septembre 1783, le nommé Antoine Marlet, grénadier au Régiment de Bearn, âgé d'environ trente ans et d'un fort tempérament, fut attaqué d'une colique violente, accompagnée de constipation et de vomissemens continuels. Ce malheureux crut trouver, en avalant deux balles de plomb du poids d'une once chacune, un spécifique contre sa maladie. Ses espérances furent vaines: les accidens augmentèrent. il entra à l'hôpital Militaire de Brest le lendemain à quatre heures du soir. il éprouvait alors des douleurs inouies dans toute la région ombilicale et iliaque droite. Les contorsions, les cris qu'il faisait donnaient des marques d'un état vraiment déplorable. Le pouls était petit concentré, et le visage très pâle. On n'appercevait aucune tumeur dans toute l'étendue de l'abdomen. On lui fit prendre d'abord beaucoup d'eau tiède, des bains, des lavemens, l'émétique et ensuite des potions huileuses. Ces remèdes ne produisirent aucun soulagement; il les

ARC 15d 60 n°1
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

rendit sur le champ, les uns par le haut, les autres par le bas. Le 3.e, le 4.e jour, on réitéra les bains, les lavemens, les potions huileuses. ils furent suivis d'un surcroît de douleurs et d'accidens. Le hoquet, les angoisses, la suppression d'urine se manifestèrent.

Le cinquième jour, le Médecin, chargé du soin de ce malade, appela à son secours les principaux Officiers de santé de l'hôpital. ils ajoutèrent au traitement la saignée, les boissons adoucissantes et quelques lavemens de fumée de tabac. La saignée, qui fut réitérée au bout de deux heures, parut diminuer la douleur; mais cela ne fut pas de longue durée. La tuméfaction du bas-ventre, le délire, les syncopes se mirent de la partie, et le sujet mourut d'une vraie passion iliaque, le 17 du même mois à quatre heures du matin.

A l'ouverture du cadavre, nous trouvâmes les vaisseaux du grand épiploon, de l'estomac, gorgés de sang; les intestins duodénum et jéjunum phlogosés et excessivement gonflés par l'air. L'ileon était enflammé, noirâtre et distendu aussi par le même élément. A quatre pieds de son extrémité inférieure, une portion de cet intestin, longue d'environ vingt pouces, repliée sur elle même, tendue comme un ballon, contenant une des balles et une matière jaunâtre très fétide, était fortement étranglée par une appendice digitale contre nature, que ce boyau

fournissait lui même. Cette appendice que je conserve dans l'esprit de vin, avec le cœcum, une grande portion de l'ileon et du mésentère, était située obliquement de gauche à droite dans la région ombilicale et iliaque droite, dessous quelques circonvolutions d'intestin. Elle a près de six pouces de long, la forme d'une anse et la même structure que l'intestin. Elle est creuse dans les trois quarts de son étendue. Sa grande extrémité, correspondant au côté gauche, s'ouvre dans le bord convexe de l'ileon, et a presque le même diamétre que cet intestin; l'autre extrémité, se portant vers le côté droit, se termine par un petit cordon ligamenteux, aplati, et parfaitement oblitéré, à la face inférieure du mésentère, à un pouce et demi de distance de la petite courbure de l'ileon. Son bord convexe est libre et flottant; le concave, en partie contigu à la grande courbure de l'ileon par un prolongement de sa tunique externe, forme un anneau du diamétre d'au moins un pouce et demi, dans lequel était étranglée la portion intestinale susdite.

Le cœcum et une partie du colon étaient pleins de matière stercorale assez dure, malgré les lavemens de toute espece que le malade avait pris; d'ailleurs ils étaient dans leur état naturel. La vessie était resserrée, et ne contenait pas une seule goutte d'urine. Nous ne remarquâmes rien de particulier au foie, à la rate, aux reins &c., et nous ne trouvâmes nulle part la seconde balle.

Caussade chi. aide m.
de l'hôpital militaire de
Brest.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

No. 6. deux pièces

M. Caufrade

Hernie avec Etranglement interne.